

・コップ1杯（約200ml）を15分ほどかけて、全量をゆっくり飲んでください。
 特にご高齢の方は、時間をかけてゆっくり飲んでください。

（途中で便意を催した時は、排便し引き続き全部飲んでください。）

☆飲み始めて30分から1時間後に最初の排便が起こります。

☆その後数回（5～8回）にわたって液状の排便があります。

☆排便回数とともに便の状態は固形→泥状便→黄色の水様便に変化していきます。
 にごりがなく、うすい黄色（尿の色くらい）になったら腸の中はきれいになっています。

☆もし全量飲まれてもうすい黄色の液にならなかった場合は、看護師に声をお声かけください。



◎ガンコな便秘あるいは2～3日排便のない方は申し出てください。

◎服用中あるいは服用後に次の症状があらわれた場合には、服用を止めすぐに看護師に連絡してください。

1. 気分が悪い 2. 吐き気がする 3. 吐いた 4. お腹が痛い
5. めまいがする 6. 顔が青ざめる 7. 寒気がする
8. じんましんが出る 9. 息苦しい 10. 意識がぼんやりする
11. 手足に力が入らない 12. 皮膚が赤くなる 13. 脈がおそくなる
14. 血の混じった便

◎マグコロールを服用して2時間以上たっても排便がない場合にも看護師にお伝え下さい。

※排便回数とともに便の状態は左から右のような⑤黄色い水様便になります。

①



②




③



④



⑤



⑤の便になったのを2回確認いたしますので、黄色い水様便になりましたら、看護師にお声かけください。